



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego Honey Tuss, a następnie zachować ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

Honey Tuss Syrop na bazie miodu

Wyrób medyczny

125 ml

MD REF ENT50

1. Co to jest syrop Honey Tuss?

Syrop na bazie miodu **Honey Tuss**, o smaku pomarańczowo-imbrowym, to wyrób medyczny na bazie miodu lipowego, zawierający hialuronian sodu oraz PVP (poliwinylpirolidon).

Dzięki obecności PVP produkt tworzy na powierzchni błon śluzowych jamy ustnej i gardła mukoadhezyjny film chroniący je przed drażniącym wpływem czynników zewnętrznych (np. bakterie, wirusy). Funkcja barierowa składnika PVP wykazuje wysoką skuteczność w łagodzeniu suchego kaszlu oraz zapalenia błon śluzowych. Dodatkowo zawarty w składzie hialuronian sodu wykazuje działanie nawilżające, co zwiększa elastyczność błon śluzowych, łagodzi podrażnienia, chrypkę oraz dyskomfort związany z suchością w jamie ustnej. Działanie nawilżające hialuronian sodu sprzyja usuwaniu zalegającej wydzieliny, łagodząc tym samym kaszel mokry.

Syrop na bazie miodu **Honey Tuss** można stosować profilaktycznie u osób, które narażone są na działanie drażniących czynników zewnętrznych, np. zanieczyszczone, suche powietrze, dym nikotynowy, u osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także u osób intensywnie pracujących głosem (nauczyciele, aktorzy, śpiewacy, prelegenci, konferansjerzy itp.). Zastosowanie miodu lipowego zapewni przyjemny smak wyrobu.

2. W jakim celu stosuje się syrop Honey Tuss?

- w celu łagodzenia suchego oraz mokrego kaszlu, a także kaszlu nocnego i poinfekcyjnego,
- wspomagająco podczas terapii stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i gardła o różnej etiologii, m.in.: zapalenie gardła (*pharyngitis*), zapalenie migdałków (*tonsillitis*), afty (*aphtosis*), w przypadku suchości błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
- w celu łagodzenia objawów związanych z podrażnieniami błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. świąd, pieczenie, zaczerwienienie błon),
- na suche i drapiące gardło u osób intensywnie pracujących głosem (nauczyciele, aktorzy, śpiewacy, prelegenci, konferansjerzy itp.),
- u osób szczególnie narażonych na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak: suche, klimatyzowane, zimne lub zanieczyszczone powietrze.

3. Dawkowanie i sposób użycia

Syrop **Honey Tuss** należy stosować zgodnie z instrukcją używania.

Wyrób przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

Dawkowanie:

Dzieci:

- od 3. do 6. roku życia: 4 ml raz dziennie,
- od 7. do 9. roku życia: 3 ml dwa razy dziennie,
- od 10. do 13. roku życia: 3 ml trzy razy dziennie,
- od 14. do 17. roku życia: 6 ml trzy razy dziennie.

Dorośli:

- 15 ml syropu trzy razy dziennie.

Ostatnią dawkę należy przyjąć przed pójściem spać. Stosować produkt maksymalnie przez 7 dni.

Sposób użycia:

Wyjąć zawartość z opakowania. Ustawić kieliszek na płaskiej, oświetlonej powierzchni. Wstrząsnąć butelką. Otworzyć produkt zgodnie z rysunkiem zamieszczonym na nakrętce butelki. Wlać odpowiednią dawkę syropu do kieliszka, a następnie wypić.

W przypadku stosowania wyrobu medycznego u dzieci podać dziecku odmierzoną dawkę produktu do wypicia.

Po przyjęciu preparatu oczyścić zewnętrzną część butelki (gwint), umieścić nakrętkę na szyjce butelki i zakręcić.

Kieliszek miarowy umyć w ciepłej wodzie z dodatkami niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie myć kieliszka w zmywarce.

Po otwarciu produkt należy zużyć w przeciągu miesiąca.

W przypadku pominięcia dawki nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia.

Syropu nie należy rozcieńczać.

Nie pić produktu bezpośrednio z butelki.

Nie płukać jamy ustnej, nie pić i nie jeść przynajmniej przez godzinę po zastosowaniu produktu.

Nie stosować równocześnie z innymi produktami przyjmowanymi doustnie.

4. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu.

W szczególności produkt nie powinien być stosowany u osób uczulonych na miód i produkty pszczele.

Nie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwią-

zanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Miód zawarty w syropie zawiera cukry proste, głównie glukozę i fruktozę.

Syrop charakteryzuje się wysoką zawartością cukrów. W przypadku osób chorych na cukrzycę stosowanie wyrobu należy uzgodnić z lekarzem.

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania wyrobu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią używanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.

W przypadku dzieci wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

W razie wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się przez czas dłuższy niż 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu oraz gdy opakowanie i kieliszek miarowy są uszkodzone.

Ponieważ syrop może obniżyć wchłanianie innych preparatów przyjmowanych doustnie, należy zachować 2-godzinny odstęp między aplikacjami.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

5. Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

Z uwagi na obecność miodu w składzie produktu osad i ciemnienie produktu nie stanowią wady produktu.

6. Skład

Składniki główne: PVP (poliwinylpirolidon) (7%), hialuronian sodu (0,1%).


Składniki pomocnicze: woda oczyszczona, miód lipowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, aromat pomarańczowo-imbirowy, kwas cytrynowy.

7. Zawartość opakowania

Butelka zawiera 125 ml wyrobu.

Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, butelkę z etykietą, kieliszek miarowy oraz instrukcję używania.

 Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl
office@gofarm.pl

 Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl
office@synoptispharma.com



Objaśnienie symboli użytych na opakowaniu:



Producent



Dystrybutor



Data ważności



Numer serii



Zapoznaj się z instrukcją używania



Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone



Ograniczenie temperatury



Wyrób medyczny



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu



Numer katalogowy

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: listopad 2025.

HT/R/IU/11/2025