



INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Peti Tuss, syrop



Świat Zdrowia

1. Przeznaczenie wyrobu

Peti Tuss to wyrób medyczny stosowany w celu łagodzenia podrażnienia dróg oddechowych, np. gardła w wyniku suchego kaszlu.

Dzięki swojemu składowi wyrób medyczny **Peti Tuss** tworzy cienką warstwę ochronną na powierzchni gardła, nawilża je, łagodzi dyskomfort, co przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości suchego kaszlu wywołanego infekcjami górnych dróg oddechowych oraz zewnętrznymi czynnikami drażniącymi, takimi jak: dym papierosowy, zanieczyszczenie, smog, kurz, suche powietrze itp.

2. Skład wyrobu

Wyrób medyczny **Peti Tuss** zawiera: glicerol, maltitol ciekły, hydroksyetylocelulozę, sodu benzoesian, kwas cytrynowy bezwodny, wodę oczyszczoną.

Peti Tuss nie zawiera cukru, barwników, parabenów ani aromatów. Wyrób zawiera maltitol jako substancję słodzącą.

Peti Tuss jest dostępny w butelce szklanej o pojemności 120 ml z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci. Opakowanie jednostkowe stanowią kartonik, butelka z etykietą, dozownik w formie strzykawki ułatwiający dozowanie i podawanie syropu oraz instrukcja używania.

3. Sposób użycia

W celu podania odpowiedniej dawki syropu należy posługiwać się dozownikiem w formie strzykawki dołączonym do opakowania. Będąc w pozycji pionowej, wprowadzić końcówkę strzykawki do ust (w przypadku dziecka preparat aplikuje opiekun) i podawać wolno, płynnym ruchem, tak aby można było połknąć wymienioną poniżej dawkę syropu.

Wiek	Dawka
Niemowlęta w wieku od 6. do 12. miesiąca życia	5 ml (jedna dawka) 1 raz dziennie W razie potrzeby można podać 3 do 4 dawek dziennie
Dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat	5 ml (jedna dawka) 2 razy dziennie W razie potrzeby można podać 3 do 4 dawek dziennie
Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli	5 ml (jedna dawka) 6-8 razy dziennie

Należy zachować przerwę 3-4 godzin między dawkami.

W przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia podania syropu **Peti Tuss** o zamierzonej godzinie nie należy stosować podwójnej dawki. Należy stosować jednorazowo zalecaną dawkę dostosowaną do wieku.

Po każdym użyciu należy przepłukać strzykawkę letnią wodą, pozostawić do wysuszenia (nie stosować środków i urządzeń do czyszczenia - zmywarka).

Przez około pół godziny od aplikacji nie pić ani nie spożywać posiłków w celu zachowania właściwości powłoki ochronnej.

Można stosować niezależnie od pory dnia.

Peti Tuss może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje dotyczące dozownika w formie strzykawki

Do opakowania wyrobu medycznego dołączony jest dozownik w formie strzykawki umożliwiający precyzyjne odmierzenie i podanie odpowiedniej dawki. Nie należy stosować dozownika od innego produktu.

4. Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po otwarciu butelki zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności podanym na etykiecie butelki i na kartoniku.

5. Przeciwwskazania

- Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
- Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku dziedzicznej nietolerancji fruktozy ze względu na obecność maltitolu przekształcanego do fruktozy.

6. ⚠️ Ostrzeżenia

- Kaszel jest często związany z infekcją dróg oddechowych, ale również może towarzyszyć zapaleniu krtań, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu płuc, astmie itp., które wymagają specjalistycznego leczenia. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów towarzyszących suchemu kaszlowi, wskazujących na poważny stan pacjenta (trudności w oddychaniu, gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 dni, nawracające wymioty, trudności z jedzeniem, biegunka, zmiany zachowania lub zaburzenia snu itp.), należy skonsultować się z lekarzem.
- U niemowląt w wieku od 6 do 12 miesiąca życia wskazana jest konsultacja medyczna.
- W przypadku zastosowania zbyt dużych ilości może mieć działanie przeczyszczające.

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W razie przypadkowego kontaktu syropu z nosem, oczami lub uszami dziecka należy przemyć takie miejsce roztworem soli fizjologicznej w celu usunięcia syropu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić bezpośrednio do wytwórcy wyrobu oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
 tel.: +48 22 49 21 301
 faks: +48 22 49 21 129
 e-mail: incydenty@urpl.gov.pl

Wytwórca syropu:

Curtis Health Caps S.A.
 Wysogotowo, ul. Batorowska 52
 62-081 Przeźmierowo, Polska
 tel.: +48 61 625 27 00
 e-mail: office@chc.com.pl
 www.chc.com.pl



Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
 ul. Krakowiaków 65
 02-255 Warszawa, Polska
 e-mail:
 office@synoptispharma.com
 www.synoptispharma.pl

Wytwórca strzykawki:

Rovipharm
 ZA de Lucinges
 86, Route du Plan d'Eau
 01370 Treffort-Cuisiat - Francja



7. Zastosowane symbole i oznaczenia

Symbole użyte na opakowaniu



Wytwórca



Użyć do daty



Kod partii



Zajrzyj do instrukcji używania



Dopuszczalna temperatura



Ostrzeżenie

Data opracowania instrukcji używania: 2025-11

Dodatkowe informacje dla użytkownika

Przyczyny suchego kaszlu

Suchy kaszel jest uciążliwą dolegliwością, może występować w wielu różnych sytuacjach, nie zawsze związanych z procesem chorobowym.

- W 80% przyczyną suchego kaszlu są zakażenia dróg oddechowych o podłożu wirusowym.
- Do występowania napadowego przewlekłego suchego kaszlu dochodzi również na skutek przebytej infekcji, w wyniku której nasila się wrażliwość receptorów kaszlowych. Nadreaktywność, czyli nadwrażliwość oskrzeli, manifestuje się występowaniem kaszlu w odpowiedzi na wysiłek fizyczny (u małego dziecka takim wysiłkiem jest np. karmienie czy raczkowanie), wdychanie powietrza o zmienionej temperaturze (np. wyjście zimą z cieplejszego pomieszczenia na zewnątrz) lub wilgotności (zwłaszcza suchego powietrza), rozgrzanie ciała (kaszel często występuje po gorącej kąpeli) lub zanieczyszczenie powietrza. Przyjmuje się, iż kaszel pozostały po przebytej wirusowej infekcji górnych dróg oddechowych może trwać trzy do ośmiu tygodni.
- Do napadów suchego, bezproduktywnego kaszlu dochodzi również po podrażnieniu kaszlowych receptorów czuciowych czynnikami mechanicznymi czy chemicznymi, takimi jak np. kurz, dym papierosowy czy zbyt suche lub zimne powietrze.
- Często przyczyną kaszlu, szczególnie u bardzo małych dzieci, jest również refluks żołądkowo-przełykowy. Do pierwszego roku życia może być on fizjologiczny, wiąże się z niedojrzałością anatomiczną i czynnościową przewodu pokarmowego najmłodszych pacjentów.

Jak działa syrop Peti Tuss?

Dzięki swojemu składowi wyrób medyczny **Peti Tuss** tworzy cienką warstwę ochronną na powierzchni gardła, nawilża je, łagodzi podrażnienie oraz niewielki ból związany z suchym kaszlem. Odpowiednia lepkość syropu **Peti Tuss** zapewnia dłuższy kontakt syropu z błoną śluzową.

Głównym składnikiem wyrobu medycznego **Peti Tuss** jest glicerol, który pełni funkcje powlekające i nawilżające, dzięki czemu może być stosowany w łagodzeniu podrażnienia dróg oddechowych w wyniku suchego kaszlu.